



## Interne Geneeskunde / Reumatologie

# Infuus met Remicade (Infliximab)

### Inleiding

Uw specialist heeft voor u een infuus met Remicade voorgeschreven. Door middel van deze folder willen wij u informeren over dit medicijn. Deze folder is een aanvulling op de mondelinge informatie, die de specialist of verpleegkundige reeds heeft verteld.

### Werking

Remicade wordt onder andere gebruikt voor de behandeling van de ziekte van Crohn, Colitis ulcerosa en Reumatoïde artritis. Bij deze ziekten is er sprake van een overmatige ontstekingsreactie en Remicade remt deze ontstekingsreactie.

Remicade wordt toegediend via een infuus op de Dagbehandeling Interne geneeskunde (DIG) in het ziekenhuis. Dit duurt ongeveer 2 uur en daarna moet u nog een half uur tot een uur blijven om er zeker van te zijn dat er geen ongewenste reacties optreden.

Na het eerste infuus volgt een behandeling na twee weken en na zes weken en vervolgens elke zes tot acht weken, afhankelijk van uw ziekteverloop en altijd in overleg met uw behandelend arts.

De arts spreekt de dosering af; deze is afhankelijk van uw lichaamsgewicht en van de mate van ontstekingen.

Remicade kan snel werken, soms al na twee dagen. Vaak zijn enkele weken nodig om voldoende resultaat te bereiken.

### Bijwerkingen

Het is mogelijk dat er een overgevoeligheidsreactie optreedt bij de behandeling met Remicade.

Verschijnselen zijn: huiduitslag of netelroos, vermoeidheid, problemen met de ademhaling zoals benauwdheid en piepend ademen en daling van de bloeddruk.

Wanneer u een van deze verschijnselen opmerkt moet u de verpleegkundige waarschuwen. Deze kan dan actie ondernemen.

Andere zeldzame bijwerkingen/reacties zijn:

- pijn of een zwak gevoel in de spieren, de gewrichten, op de borst of in de kaak
- zwelling van handen, voeten en/of enkels, gezicht, lippen, mond of keel
- koorts, huiduitslag, jeuk

Bij deze verschijnselen moet u contact opnemen met uw verpleegkundige of arts.

Verder kan een behandeling met Remicade soms griepachtige verschijnselen geven als, misselijkheid, buikpijn, hoofdpijn, duizeligheid, spierpijn, maagdarmproblemen. De bijwerkingen verdwijnen meestal spontaan. Wel is het belangrijk deze bij een volgend bezoek aan de polikliniek te melden.



### Belangrijk!

Doordat u Remicade gebruikt is er een verhoogde kans op infecties. Uw afweersysteem wordt door Remicade onderdrukt, waardoor u sneller infecties kunt oplopen en het genezingsproces trager verloopt. U mag geen Remicade toegediend krijgen als u een infectie heeft; neem daarom altijd contact op met uw specialist of de verpleegkundige van de dagbehandeling als u een infectie heeft.

U wordt een dag voor de behandeling gebeld door de verpleegkundige om na te gaan of de behandeling door kan gaan (geen ziekte, koorts of infectie), zodat de Remicade de volgende dag voor uw komst bereid kan worden. U zelf kunt op de dag van de behandeling tot 10.30 uur bellen met de verpleegkundige als onverhoopt de behandeling toch niet plaats kan vinden.

Neem daarom altijd een dag voor elke behandeling onderstaande vragenlijst door. Als u een van de vragen met "ja" beantwoordt, dan moet u vooraf eerst overleggen met uw behandelend arts of met de verpleegkundige van de dagbehandeling.

### Zwangerschap

Remicade zal u niet gegeven worden als u zwanger bent.

Als u Remicade wordt gegeven, moet u vermijden zwanger te worden door het gebruik van geschikte voorbehoedmiddelen tijdens uw behandeling en tot ten minste zes maanden na het laatste infuus met Remicade.

### Als u al eerder met Remicade bent behandeld

Stel uw arts ervan op de hoogte als u in het verleden met Remicade bent behandeld en nu opnieuw met een Remicadebehandeling begint.

Als uw behandeling met Remicade langer dan 16 weken onderbroken is, is er een verhoogde kans op allergische reacties als u weer met de behandeling begint.

### Vaccinaties

Tijdens de behandeling met Remicade is een jaarlijkse grieprik toegestaan mits u deze 14 dagen voor de Remicade toediening haalt.

Voor overige vaccinaties kunt u het best vooraf contact opnemen met uw behandelend specialist.

### Vragenlijst

	Ja	Nee
1. Heeft u de afgelopen dagen koorts gehad?		
2. Heeft u de afgelopen dagen keelpijn gehad?		
3. Heeft u de afgelopen dagen diarree gehad?		
4. Heeft u huidinfecties zoals steenpuisten of wonden?		
5. Heeft u benauwdheidsklachten of moet u vaak hoesten?		
6. Heeft u pijn bij het plassen?		
7. Heeft u bijwerkingen ondervonden bij het vorige Remicade infuus?		
8. Bent u op dit moment erg verkouden?		
9. Heeft u onlangs antibiotica gebruikt?		
10. Bent u de afgelopen dagen kortademig en/of heeft u last van gezwollen enkels?		
11. Bestaat de kans dat u binnenkort wordt opgenomen voor een operatie?		
12. Bent u zwanger of heeft u een zwangerschapswens?		
13. Heeft u afgelopen periode contact gehad met TBC-patiënten?		



### **Vragen**

Indien u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kunt u deze stellen aan de specialist of verpleegkundige.

De specialist kunt u bereiken via de betreffende polikliniek. De poliklinieken zijn elke werkdag van 8.30 tot 16.30 uur bereikbaar.

Het telefoonnummer van de DIG is: 0543 54 46 44

### **Geheimhouding en recht op privacy**

Alle medewerkers van ons ziekenhuis, dus ook artsen en verpleegkundigen, hebben een geheimhoudingsplicht. Ook hebt u recht op privacy. Uitgebreide informatie staat in de folder 'De rechten en plichten van de patiënt', verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Ook staat de folder op: [www.skbwinterswijk.nl](http://www.skbwinterswijk.nl)